

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ИГНИОПУНКТИРНАЯ ГЕРНИОГРАФИЯ ПАХОВЫХ ГРЫЖ У ДЕТЕЙ

Самаркандский государственный медицинского университет,
г. Самарканд, Узбекистан

Актуальность. В настоящее время паховые грыжи являются одной из хирургической патологией у детей, требующей оперативного лечения. Лапароскопическая хирургия приобретает все большее значение в детской хирургии, в том числе и для диагностики и лечения паховых грыж. Однако, вопросы эффективности и безопасности применения лапароскопической игниопунктирной герниорафии при паховых грыжах у детей требуют дальнейшего исследования.

Цель исследования. Исследовать эффективность и безопасность лапароскопической игниопунктирной герниорафии в диагностике и лечении паховых грыж у детей.

Материал и методы. Исследование проводилось в специализированной детской хирургической клинике СамГМУ в период с января 2021 по декабрь 2023 года. Включены данные 125 детей с паховыми грыжами, подвергнутых лапароскопической игненопунктирной герниорафии. Средний возраст пациентов составил 3-7 лет. Мальчиков было 109 (87,2%), больше, чем девочек 16 (12,8%). Использованы статистические методы для анализа результатов.

Результаты. Лапароскопическая игненопунктирная герниорафия успешно подтвердила свою высокую диагностическую точность в определении патологии паховых грыж у детей. Хирургическое вмешательство, основанное на результатах этого метода, прошло практически без осложнений и рецидивов. Сокращение времени восстановления после операции способствовало быстрой реабилитации пациентов и их оперативному возвращению к обычной жизни. Таким образом, данные результаты подтверждают эффективность и безопасность лапароскопической игненопунктирной герниорафии в диагностике и лечении паховых грыж у детей, что делает ее предпочтительным методом в детской хирургической практике.

Выводы. Таким образом, основными выгодами лапароскопической операции при коррекции грыж у детей являются сокращения количества послеоперационных осложнений, пребывание больных в стационаре и косметический эффект.